




أولاً : اجب عن خمسة فقط من الأسئلة الممتة الآتية : (40 درجة لكل سؤال)

السؤال الأول : نتأمل جانباً الخط البياني C للتابع f المعروف على المجال $]0, +\infty[$ والمطلوب :



- (1) جد $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- (2) دل على القيمة الحدية المحلية للتابع f مبيناً نوعها .
- (3) جد حلول المتراجحة : $f'(x) \leq 0$
- (4) جد مجموعة تعريف التابع : $g: x \mapsto \ln(f(x))$

السؤال الثاني :


في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نتأمل النقطتين $A(1,3,2)$ و $B(3,-1,3)$ ومستويًا P يقبل $\vec{u}(2,1,0)$ و $\vec{v}(3,2,2)$ شعاعين موجهين له . أثبت أن المستقيم (AB) يعامد P ثم اكتب معادلة ديكرتية للمستوي P إذا علمت أنه مار من المبدأ .

السؤال الثالث :

ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على المجال $]0, +\infty[$ وفق : $f(x) = \sqrt{x} \cdot \sin(\sqrt{x})$:
 (1) أثبت أن f اشتقاقي عند (0) وأوجد $f'(0)$.
 (2) اكتب معادلة لمماس الخط C في النقطة التي فاصلتها $x = 0$

السؤال الرابع :

ليكن A, B حدثين مرتبطين بتجربة عشوائية ممثلة بالمخطط الشجري المجاور
 المطلوب : أكمل المخطط الشجري ثم احسب $P(A|B)$.



السؤال الخامس :

ليكن التابع f المعروف على R وفق : $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ والمطلوب :
 ادرس تغيرات التابع f واستنتج أنه تابع محدود

السؤال السادس :

عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق المساواة التالية : $12 \binom{n+2}{4} = 7P_n^3$

ثانياً: حل التمارين الثلاثة الآتية : (70 درجة لكل من التمرينين الأول والثاني - 60 للتمرين الثالث)

التمرين الأول : ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على $I =]0, +\infty[$ وفق : $f(x) = ax + b - \ln x$

- (1) جد العددين a, b إذا علمت أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = 1$ مماس للخط C في نقطة A منه فاصلتها 1
- (2) من أجل $a = 1, b = 0$ ادرس تغيرات التابع f ونظّم جدولاً بها.



الصفحة الثانية

التعريف الثاني :

المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_0 = 2$ وعند كل عدد طبيعي n بالعلاقة : $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n}$

- (1) أثبت أن $u_n > 1$ أياً كان العدد الطبيعي n .
- (2) أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة واستنتج أنها متقاربة واحسب نهايتها.
- (3) لتكن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة $v_n = 3 + \frac{1}{u_{n-1}}$

- أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ حسابية.
- اكتب v_n بدلالة n واستنتج أن : $u_n = \frac{n+2}{n+1}$

التعريف الثالث : نتأمل معلماً متجانساً $(O; \vec{u}, \vec{v})$ في المستوي العقدي

- (1) ليكن العدد العقدي $w = \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i}$ أثبت أن $|w| = 1$
- (2) تحقق أن $Z_1 = i\sqrt{3}$ حلاً للمعادلة : $Z^2 - (1 + i\sqrt{3})Z + i\sqrt{3} = 0$ ثم جد Z_2 الحل الآخر.
- (3) لتكن النقاط M و M_1 و M_2 التي تمثلها الأعداد العقدية السابقة w و Z_1 و Z_2 بالترتيب إذا علمت أن M_1 صورة M وفق تحاك مركزه M_2 ونسبته k أحسب k .

ثالثاً - حل المسالتين الآتيتين : (100) درجة لكل مسألة

المسألة الأولى :

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقاط : $A(1, -1, 3)$, $B(0, 3, 1)$, $C(6, -7, -1)$, $D(2, 1, 3)$, $E(4, -6, 2)$

والمطلوب :

- (1) أثبت أن E مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المنقلة : $(A, 2)$, $(B, -1)$, $(C, 1)$
- (2) بين أن المجموعة E المكونة من النقاط M التي تحقق العلاقة : $\|2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 2\sqrt{21}$ هي كرة مركزها E ونصف قطرها $R = \sqrt{21}$
- (3) بين أن النقاط A و B و D تعين مستويًا اكتب معادلته.
- (4) أعط تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (EC) ثم بين أن (EC) يعامد المستوي (ABD) بنقطة H يطلب إيجاد إحداثياتها.
- (5) إذا علمت أن مساحة المثلث ABD هي $\sqrt{14}$ فاحسب حجم الهرم (E, ABD) .

المسألة الثانية :


في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على المجال $]0, +\infty[$ بالعلاقة :

$$f(x) = x + \frac{2}{\sqrt{x}} - 4 \quad \text{والمطلوب :}$$

- (1) أثبت أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x - 4$ مقارب مائل للخط C ثم أدرس الوضع النسبي للخط C مع المقارب Δ
- (2) ادرس تغيرات التابع f ونظم جدولاً بها وبين ما للتابع من قيم حدية محلية وما للخط البياني من مستقيمات مقاربة أفقية أو شاقولية.
- (3) أثبت أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلين مختلفين واحصر كل منها بين عددين صحيحين متتاليين.
- (4) ارسم كل مقارب وجننه ثم ارسم C .
- (5) احسب مساحة السطح المحصور بين C و Δ والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x = 3$ و $x = 4$.

حلول النموذج الأول من نماذج مجموعة البكالوريا السورية

السؤال الأول : نتأمل جانباً الخط البياني C للتابع f المعروف على المجال $]0, +\infty[$ والمطلوب :



- (1) جد $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- (2) دل على القيمة الحدية المحلية للتابع f مبيناً نوعها .
- (3) جد حلول المتراجحة : $f'(x) \leq 0$
- (4) جد مجموعة تعريف التابع : $g: x \mapsto \ln(f(x))$

الحل :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$f(1) = 0 \quad (2) \quad \text{قيمة حدية صغرى محلية}$$

$$x \in]0,1] \quad (3)$$

$$D_g =]0,1[\cup]1, +\infty[\quad (4)$$



إعداد المدرسين : أ. رامي شقرا - أ. وائل أبو الخير - أ. يوليا برم

إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد

تنسيق المهندس حسام قاسم

السؤال الثاني :

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نتأمل النقطتين $A(1,3,2)$ و $B(3, -1,3)$ ومستويًا P يقبل $\vec{u}(2,1,0)$ و $\vec{v}(3,2,2)$ شعاعين موجّهين له أثبت أن المستقيم (AB) يعامد P ثم اكتب معادلة ديكرارية للمستوي P إذا علمت أنه مار من المبدأ .

الحل :

شعاع توجيه (AB) هو $\overline{AB}(2, -4,1)$

$$\overline{AB} \cdot \vec{u} = 4 - 4 + 0 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \overline{AB} \perp \vec{u} \quad \dots (1)$$

$$\overline{AB} \cdot \vec{v} = 6 - 8 + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \overline{AB} \perp \vec{v} \quad \dots (2)$$

من (1) و (2) نستنتج أن $(AB) \perp P$

$$P: a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \quad : \quad \overline{AB}(2, -4,1) \text{ شعاع ناظم على } P$$

$$P: 2x - 4y + z = 0$$



إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد

تنسيق المهندس حسام قاسم

إعداد المدرس علي جمول

تنسيق المدرسين: يوسف منصور ✨ فادي المحمد ✨ مهدي حريقة ✨ أمين الحايك ✨ زهدب يوسف ✨ علي جمول ✨ مصطفى الرزوق

السؤال الثالث :

ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على المجال $[0, +\infty[$ وفق $f(x) = \sqrt{x} \cdot \sin(\sqrt{x})$:
 (1) أثبت أن f اشتقاقي عند (0) وأوجد $f'(0)$.
 (2) اكتب معادلة لمماس الخط C في النقطة التي فاصلتها $x = 0$.

الحل :

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} \cdot \sin(\sqrt{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = 1 \in \mathbb{R}$$

فالتابع f اشتقاقي عند (0) و $f'(0) = 1$

(2) معادلة المماس في المبدأ $(0,0)$:

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$y = 1(x) + 0$$

$$y = x$$



إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد



تنسيق المهندس حسام قاسم

إعداد المدرس فادي طنوس

السؤال الرابع :

ليكن B, A حدثين مرتبطين بتجربة عشوائية ممثلة بالمخطط الشجري المجاور
 المطلوب : أكمل المخطط الشجري ثم احسب $P(A|B)$.

الحل :



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B)$$

$$P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{12} + \frac{4}{15} = \frac{21}{60} = \frac{7}{20}$$

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{7}{20}} = \frac{20}{84} = \frac{5}{21}$$



إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد

تنسيق المهندس حسام قاسم

إعداد المدرس جمال الخليل

السؤال الخامس :

ليكن التابع f المعروف على R وفق : $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ والمطلوب :

أدرس تغيرات التابع f واستنتج أنه تابع محدود

الحل :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} > 0$$

بالتالي f متزايد تماماً على R

نلاحظ أن : $f(x) \in]0,1[$ فهو تابع محدود

((أو يمكن كتابة جدول التغيرات ويستنتج المحنودية))



إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد

تنسيق المهندس حسام قاسم

إعداد الأستاذ عبد الحميد السيد

السؤال السادس :

عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق المساواة التالية : $12 \binom{n+2}{4} = 7P_n^3$

الحل :

$$12 \binom{n+2}{4} = 7P_n^3$$

شرط الحل : $n \geq 3$

$$n \geq 2 \quad \text{ومنه} \quad n+2 \geq 4$$

بالتالي الشرط : $n \geq 3$

$$12 \frac{(n+2)(n+1)(n)(n-1)}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 7n(n-1)(n-2)$$

$$n^2 + 3n + 2 = 14(n-2)$$

$$n^2 - 11n + 30 = 0$$

$$(n-5)(n-6) = 0$$

$$n = 6 \quad \text{مقبول} \quad , \quad n = 5 \quad \text{مقبول}$$



إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد

تنسيق المهندس حسام قاسم

إعداد المدرسة لميس الصوصو

تدقيق المدرسين : يوسف منصور ✨ فادي المحمد ✨ مهند حريقة ✨ أمين الحايك ✨ زهدب يوسف ✨ علي جمول ✨ مصطفى الرزوق

ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على $I =]0, +\infty[$ وفق : $f(x) = ax + b - \ln x$

- (1) جد العددين a, b إذا علمت أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = 1$ مماس للخط C في نقطة A منه فاصلتها 1
 (2) من أجل $a = 1, b = 0$ ادرس تغيرات التابع f وتظّم جدولاً بها .

الحل :

(1) $A(1,1)$ نقطة تماس Δ مع الخط C

f اشتقاقي على $I =]0, +\infty[$ ومشتقه :

$$f'(x) = a - \frac{1}{x}$$

$$f'(1) = m_{\Delta}$$

• ميل المماس Δ يساوي الصفر

$$f'(1) = 0$$

$$a - 1 = 0$$

$$a = 1$$

$$f(1) = 1$$

• A نقطة من C هذا يكافئ

$$1 + b - 0 = 1$$

$$b = 0$$

$$f(x) = x - \ln x \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

$$f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) \quad \text{لأجل } x > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

المقام موجب تماماً وبالتالي إشارة المشتق من إشارة البسط

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1, \quad f(1) = 1$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	0
			+
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	1
			\nearrow
			$+\infty$

إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد

تنسيق المهندس حسام قاسم

إعداد المدرس صلاح ديب

المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ معرفة وفق $u_0 = 2$ وعند كل عدد طبيعي n بالعلاقة : $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n}$

(1) أثبت أن $u_n > 1$ أيا كان العدد الطبيعي n .

(2) أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة واستنتج أليها متقاربة واحسب نهايتها

(3) لكن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة $v_n = 3 + \frac{1}{u_n - 1}$

(a) أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ حسابية . (b) اكتب v_n بدلالة n واستنتج أن : $u_n = \frac{n+2}{n+1}$

الحل :



(1) لنكن الخاصة : $E(n): u_n > 1$

ثبت صحة الخاصة لأجل $n = 0$: صحيحة $E(0): u_0 = 2 > 1$

نفترض صحة $E(n)$: $E(n): u_n > 1$ (صحيحة)

ولنثبت صحة $E(n+1)$: $E(n+1): u_{n+1} > 1$

لدينا من الفرض $u_n > 1$

حيث أن $u_{n+1} = f(u_n)$ حيث أن $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$ وبما أن $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ فالتابع f متزايد تماما على $]0, +\infty[$

$f(u_n) > f(1)$

$u_{n+1} > 1$

إذا $E(n+1)$ صحيحة و بالتالي الخاصة $E(n)$ صحيحة أيا كانت قيمة العدد الطبيعي n

(2) لنكن الخاصة : $Q(n): u_{n+1} < u_n$

ثبت صحة الخاصة لأجل $n = 0$: صحيحة $Q(0): u_1 = \frac{3}{2} < u_0 = 2$

نفترض صحة $Q(n)$: $Q(n): u_{n+1} < u_n$

ولنثبت صحة $Q(n+1)$: $Q(n+1): u_{n+2} < u_{n+1}$

من الفرض : $u_{n+1} < u_n$

بما أن التابع f متزايد تماما على $]0, +\infty[$ $f(u_{n+1}) < f(u_n)$

((إذا $Q(n+1)$ صحيحة و بالتالي الخاصة $Q(n)$ صحيحة أيا كانت قيمة العدد الطبيعي n)) $u_{n+2} < u_{n+1}$

بما أن المتتالية متناقصة ومحدودة من الألى فهي متقاربة من عدد l

وبما أن التابع f مستمر على المجال $]0, +\infty[$ فهو مستمر عند l حل المعادلة : $f(x) = x$

$$2 - \frac{1}{x} = x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

$$v_{n+1} - v_n = \left(3 + \frac{1}{u_{n+1} - 1}\right) - \left(3 + \frac{1}{u_n - 1}\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{u_n}} - \frac{1}{u_n - 1} = \frac{u_n - 1}{u_n - 1} = 1 \quad (3)$$

فالمتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية أساسها $r = 1$ ومنه $v_n = v_0 + nr$ أي $v_n = 4 + n$

$$v_n = 3 + \frac{1}{u_n - 1} \Leftrightarrow v_n - 3 = \frac{1}{u_n - 1} \Leftrightarrow u_n - 1 = \frac{1}{v_n - 3} \Leftrightarrow u_n = \frac{v_n - 2}{v_n - 3} \Leftrightarrow u_n = \frac{n+2}{n+1}$$

إشراف الأستاذ عبد الحميد السيد

تنسيق المهندس حسام قاسم

إعداد المدرس باسل سطمة

نتأمل معلماً متجانساً $(O; \vec{u}, \vec{v})$ في المستوى العقدي

$$(1) \text{ ليكن العدد العقدي } w = \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} \text{ أثبت أن } |w| = 1$$

(2) تحقق أن $Z_1 = i\sqrt{3}$ حلاً للمعادلة : $Z^2 - (1 + i\sqrt{3})Z + i\sqrt{3} = 0$ ثم جد Z_2 الحل الآخر .

(3) لتكن النقاط M و M_1 و M_2 التي تمثلها الأعداد العنقدة السابقة w و Z_1 و Z_2 بالترتيب

إذا علمت أن M_1 صورة M وفق تحالك مركزه M_2 ونسبته k أجب k .

الحل :

$$(1) |w| = \left| \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} \right| = \frac{|\sqrt{3} + i|}{|\sqrt{3} - i|} = \frac{\sqrt{3+1}}{\sqrt{3+1}} = 1$$

$$(2) P(Z) = Z^2 - (1 + i\sqrt{3})Z + i\sqrt{3}$$

$$P(i\sqrt{3}) = (i\sqrt{3})^2 - (1 + i\sqrt{3})(i\sqrt{3}) + i\sqrt{3} \\ = -3 - i\sqrt{3} + 3 + i\sqrt{3} = 0$$

إذا $Z_1 = i\sqrt{3}$ حلاً للمعادلة $P(Z) = 0$

$$Z_1 \cdot Z_2 = i\sqrt{3} \Rightarrow i\sqrt{3} \cdot Z_2 = i\sqrt{3} \Rightarrow Z_2 = 1$$

$$Z_1 - Z_2 = k(w - Z_2) \quad (3)$$

$$i\sqrt{3} - 1 = k \left(\frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} - 1 \right)$$

$$i\sqrt{3} - 1 = k \frac{2i}{\sqrt{3} - i}$$

$$k = \frac{(i\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} - i)}{2i} = \frac{3i + \sqrt{3} - \sqrt{3} + i}{2i} = \frac{4i}{2i} = 2$$



في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقاط : $E(4, -6, 2)$, $D(2, 1, 3)$, $C(6, -7, -1)$, $B(0, 3, 1)$, $A(1, -1, 3)$

(1) أثبت أن E مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المنقلة : $(C, 1)$, $(B, -1)$, $(A, 2)$

(2) بين أن المجموعة E المكونة من النقاط M التي تحقق العلاقة : $\|2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 2\sqrt{21}$

هي كرة مركزها E ونصف قطرها $R = \sqrt{21}$

(3) بين أن النقاط A و B و D تعين مستويًا اكتب معادلته .

(4) أعط تمثيلًا وسيطياً للمستقيم (EC) ثم بين أن (EC) يعامد المستوي (ABD) بنقطة H يطلب إيجاد إحداثياتها

(5) إذا علمت أن مساحة المثلث ABD هي $\sqrt{14}$ فاحسب حجم الهرم (E, ABD) .

الحل :



$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma} = \frac{2 - 0 + 6}{2} = 4 \quad (1)$$

$$y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma} = \frac{-2 - 3 - 7}{2} = -6$$

$$z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma} = \frac{6 - 1 - 1}{2} = 2$$

نلاحظ أن : $G(4, -6, 2) = E$

(2) بما أن E مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المنقلة : $(C, 1)$, $(B, -1)$, $(A, 2)$

فإن : $2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC} = 2\vec{ME}$ ومنه : $\|2\vec{ME}\| = 2\sqrt{21}$ بالتالي $\|\vec{ME}\| = \sqrt{21}$

إذا مجموعة النقاط هي كرة مركزها (E) ونصف قطرها $R = \sqrt{21}$

(3) $\frac{-1}{1} \neq \frac{4}{2} \left\{ \begin{array}{l} \vec{AB}(-1, 4, -2) \\ \vec{AD}(1, 2, 0) \end{array} \right.$ فالشعاين \vec{AD} و \vec{AB} غير مرتبطين خطياً لعدم تناسب مركباتهما

فالنقاط A و B و D لا تقع على استقامة واحدة فهي تعين مستوي

معادلة المستوي : بفرض $\vec{n}(a, b, c)$ شعاع ناظم على المستوي (ABD)

$$a = -2 \quad \text{بفرض } b = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{n} \cdot \vec{AD} = 0 \Rightarrow a + 2b = 0 \quad \dots (1) \\ \vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \Rightarrow -a + 4b - 2c = 0 \quad \dots (2) \end{array} \right.$$

$$c = 3 \quad \text{بالتعويض نجد}$$

$$(ABD): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0 \Rightarrow (ABD): 2x - y - 3z + 6 = 0$$

(4) تمثيلًا وسيطياً للمستقيم (EC) : من $E(4, -6, 2)$ و $\vec{EC}(2, -1, -3)$ شعاع موجه له .

$$(EC): \begin{cases} x = at + x_E \\ y = bt + y_E \\ z = ct + z_E \end{cases} : t \in R \Rightarrow (EC): \begin{cases} x = 2t + 4 \\ y = -t - 6 \\ z = -3t + 2 \end{cases} : t \in R$$

$(EC) \perp (ABD)$ إذا $\vec{n}_{(ABD)}(2, -1, -3) = \vec{EC}(2, -1, -3)$ (مرتبطين خطياً)

لإيجاد نقطة تقاطع المستقيم (EC) مع المستوي (ABD) نعوض المعادلات الوسيطة للمستقيم في معادلة المستوي

نجد : $t = -1$ وبالتعويض نجد : $H(2t + 4, -t - 6, -3t + 2) = H(2, -5, 5)$

(5) ارتفاع الهرم : بعد E عن (ABD) $dist(E, (ABD)) = \frac{|8 + 6 - 6 + 6|}{\sqrt{14}} = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14} = h$

$$V = \frac{1}{3} S_{ABD} \cdot h = \frac{1}{3} (\sqrt{14}) \cdot (\sqrt{14}) = \frac{14}{3}$$

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على المجال $]0, +\infty[$
بالعلاقة : $f(x) = x + \frac{2}{\sqrt{x}} - 4$ والمطلوب :

- (1) أثبت أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x - 4$ مقارب مائل للخط C ثم أدرس الوضع النسبي للخط C مع المقارب Δ
- (2) ادرس تغيرات التابع f ونظم جدولاً بها وبين ما للتابع من قيم حدية محلية وما للخط البياني من مستقيمات مقاربة أفقية أو شاقولية .
- (3) أثبت أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلين مختلفين واحصر كل منهما بين عددين صحيحين متتاليين .
- (4) ارسم كل مقارب وجنته ثم ارسم C .
- (5) احسب مساحة السطح المحصور بين C و Δ والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x = 3$ و $x = 4$.

الحل :

(1) التابع f معرف ومستمر واشتقاقي على $]0, +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y_{\Delta}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{x}} \right) = 0$$

فالمستقيم Δ الذي معادلته $y = x - 4$ مقارب مائل لـ C في جوار $+\infty$

$$f(x) - y_{\Delta} = \frac{2}{\sqrt{x}} > 0 \quad \blacksquare \quad \text{ومنه } C \text{ فوق } \Delta$$

(2) المستقيم الذي معادلته $x = 0$ وهو محور الترتيب مقارب شاقولي لـ C $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad : \quad \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0 \right)$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x\sqrt{x}} = \frac{x\sqrt{x} - 1}{x\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow f(1) = -1$$

$f(1) = -1$ قيمة صغرى محلياً

التابع f مستمر ومتناقص تماماً على $]0, 1[$

$$0 \in f(]0, 1[) =]-1, +\infty[$$

إذا للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد $\alpha \in]0, 1[$

$$0 < \alpha < 1$$

$$S = \int_3^4 (f(x) - y_{\Delta}) dx \quad (5)$$

$$S = \int_3^4 \left(\frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx = \int_3^4 4 \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx$$

$$S = \left[4\sqrt{x} \right]_3^4 = 4\sqrt{4} - 4\sqrt{3} = 8 - 4\sqrt{3}$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

(3) التابع f مستمر ومتزايد تماماً على $[1, +\infty[$

$$0 \in f([1, +\infty[) = [-1, +\infty[$$

إذا للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد $\beta \in [1, +\infty[$

$$2 < \beta < 3 \quad \left\{ \begin{array}{l} f(2) = \sqrt{2} - 2 < 0 \\ f(3) = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 > 0 \end{array} \right.$$

